ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

25e Mémoire (1)

—

XL

Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de l'ordre des ARANEÆ.

Planche 7

Par Eugène SIMON.

Séance du 23 novembre 1892.

Familia **ULOBORIDÆ.**

Uloborus semiargenteus, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax lævis, fusco-olivaceus, antice leviter testaceo-reticulatus, pilis plumosis albis fulvisque vestitus. Abdomen oblongum, parum attenuatum, subcylindraceum, antice sat convexum, supra albido-argenteum, remote testaceo-reticulatum, postice, supra mamillas, nigro-maculatum, subtus fuscum, utrinque, pone spiracula, macula albida nigro-marginata notatum. Mamillæ olivaceæ supra nigræ. Sternum nigerrimum, minute et parce albido-squamulatum. Pedes longi, testacei, femoribus anticis subtus et in parte apicali nigris sed anguste testaceo-annulatis, tibiis nigris, in medio fulvo-annulatis, tibiis metatarsisque posticis parum distincte fusco-annulatis. Pedum-maxillarium femur patellaque fulva, tibia tarsusque nigri. Vulvæ fovea transversim ovata, postice margine verticali, in medio leviter et obtuse exciso, limitata.

Le Para.

U. manicatus, n. sp. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax fusco nigricans, antice leviter dilutior, postice vitta media testacea, paululum

(1) Voir pour les mémoires 1 à 24, nos I à XXXIX, Annales de 1873 à 1892.

impressa, notatus, lævis, antice flavo postice albido-pilosus, tuberculo oculorum mediorum anticorum rufulo. Abdomen antice altum et obtusissime bigibbosum, postice longe declive et attenuatum, in lateribus et subtus pallide flavo-testaceum, supra vitta latissima, nigro-violacea, punctis parvis albidis biseriatis (2-2 vel 3-3) notata, obtectum, subtus in parte prima vitta transversa semilunari nigricanti ornatum. Mamillæ rufescentes. Sternum, coxæ trochanteresque fusco-violacea. Pedes pallide flavi, tibiis anticis atris vel fuscis, metatarsis tarsisque anticis ad apicem anguste livido-annulatis. Vulva simplex.

Prov. Amazonas : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

Familia **SICARIIDÆ.**

Plectreurys (1) **tristis**, n. sp. — ♂. Long. 7,2 mill. — Cephalothorax nigerrimus, opacus, subtiliter coriaceus, versus marginem inordinate punctato-impressus, parte thoracica lineis impressis radiantibus notata, parte cephalica læviore, setis brevibus, leviter elevatis et seriatis munita, attenuata, sat convexa sed in medio leviter depressa. Oculi postici inter se æquidistantes, medii lateralibus non multo minores, subrotundi. Oculi antici inter se subæquales, medii a sese subcontigui, a lateralibus spatio oculo non multo latiore sejuncti. Area mediorum trapeziformis, paulo latior quam longior. Oculi medii antici posticis paulo majores. Abdomen atro-cinereo-testaceum, sat dense et longe nigro-crinitum. Sternum nigrum, sat dense et grosse granulosum. Chelæ nigræ, valde et dense granulosæ. Pedes robusti, atri, tarsis cunctis metatarsisque posticis dilutioribus ; tibia antica extus ad apicem tuberculo spinifero instructa; metatarso antico curvato, subtus ad apicem aculeis paucis munito, reliquis tibiis et metatarsis numerose aculeatis. Pedes-maxillares fusco-olivacei; femore sat brevi, subrecto; patella minutissima ; tibia patella plus duplo longiore, crassiore, leviter ovata, subtus ad basin paululum convexa et longe crinita; tarso parvo et obtuso; bulbi lobo magno subgloboso, leviter depresso, spina gracillima recta vel leviter curvata lobo longiore.

♀. Long. 14 mill. — Cephalothorax coriaceus, vix impressus. Sternum coriaceum, haud granosum. Abdomen magnum. Tibia antica haud calcarata. Metatarsus anticus subrectus numerose aculeatus.

Amer. sept. : Arizona.

(1) Pour le genre *Plectreurys*, cf. E. Sim., Hist. nat. des Ar., 2e éd., 1, p. 266.

P. castanea, n. sp. — ♀. Long. 8,5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, subtiliter et uniformiter coriaceus, parce et longe setosus, haud impressus, parte cephalica vix attenuata, fronte latissima, supra levissime depressa. Oculi medii postici lateralibus paulo minores, ovati et obliqui, a lateralibus quam inter se remotiores. Oculi medii antici lateralibus fere duplo minores, inter se contigui, sed a lateralibus sat late remoti. Area mediorum trapeziformis, fere æque longa ac lata, medii antici posticis paulo minores. Abdomen cinereo-testaceum, parce et sat breviter nigro-setosum. Sternum fusco-rufescens, postice paulo dilutius, parce et minute granulosum et parce pilosum. Chelæ nigræ, transversim inordinate rugatæ. Pedes antici reliquis robustiores, fusco-rufuli, postici dilutiores, numerose aculeati. Tibia metatarsique antici subtus aculeis 4-5 instructi.

California merid.

Familia **OONOPIDÆ**.

Orchestina tubifera, n. sp. — ♀. Long. 1,5 mill. — Cephalothorax pallide flavus, lævis et nitidus. Oculi nigro-cincti, medii lateralibus saltem 1/3 majores, inter se contigui sed a lateralibus posticis spatio oculo haud angustiore sejuncti, utrinque oculi laterales similes et inter se contigui. Abdomen in parte basali ovatum et convexum, in parte apicali multo angustius, cylindraceum, curvatum et caudiforme, mamillæ terminales, albo-testaceum, supra in parte caudiformi leviter et vage infuscatum, subtus, in regione epigasteris, flavidum et leviter coriaceum. Sternum pedesque pallide flavida, tibiis metatarsisque, præsertim posticis, leviter aurantiaco-tinctis. Femora postica valde incrassata, compressa et claviformia.

Ceylon : Kandy !.

Ischnothyreus bipartitus, n. sp. — ♂. Long. 1,7 mill. — Cephalothorax lævis et nitidus, fulvus, postice dilutior, nigro-marginatus et utrinque maculis marginalibus nigris tribus notatus. Abdomen anguste ovatum, scuto dorsali totum dorsum integente, lurido-nitido, apice infuscato et prope medium vitta transversa nigricanti ornato. Sternum pedesque flavo-aurantiaca, normalia. Partes oris rufescentes. Pedes-maxillares parvi, nigri et curvati, articulis cunctis teretibus et subsimilibus, bulbo anguste piriformi, articulis reliquis cunctis simul sumptis haud breviore.

Ceylon : Galle !.

I. lymphaseus, n. sp. — ♂. Long. 1,5 mill. — Cephalothorax lævis et nitidissimus, luridus, versus marginem leviter obscurior et nigro-cinctus. Abdomen anguste ovatum, scuto dorsali totum dorsum integente, nitidissimo, viridi-olivaceo. Sternum pedesque pallide flavida, normalia. Pedes-maxillares præcedentis parvi et curvati.

Ceylon : Nawalapitiya, prope Kandy.

I. vestigator, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax sternumque fulvo-rufescentia, lævia et nitida. Area oculorum magna nigro-cincta. Scuta abdominalia fulvo-nitida, dorsale ovatum, postice attenuatum et obtusum, medium dorsum paulo superans, ventrale medium ventrem attingens. Pedes luridi, femoribus anticis intus aculeis longis 4, extus aculeis binis armatis, tibiis aculeis inferioribus 4-5 longissimis, robustis, pronis et leviter elevatis, metatarsis aculeis similibus 2-2 instructis. Pedes postici parce aculeati. Pedes-maxillares pallide luridi, femore tibiaque sat longis et cylindraceis, hoc setis rigidis longis valde hirsuto, tarso bulboque inter se coalitis, articulum magnum, ovatum apice attenuatum, formantibus.

Ceylon : Kandy !, Maturata !, Galle !.

Opopæa ambigua, n. sp. — ♀. Long. 1,5 mill. — Cephalothorax, oculi pedesque *O. deserticolæ*. Cephalothorax fulvo-rufescens, versus marginem infuscatus, supra lævis et nitidus, utrinque subtilissime striolato-coriaceus. Abdomen longe-oblongum, depressiusculum, scuta abdominalia rufula, lævia, pilis tenuibus albidis paucis munita, dorsale subtiliter et sat crebre punctatum, postice rotundum et tertiam partem apicalem attingens, ventrale subtilissime coriaceum, postice truncatum et dimidium ventris haud superans. Sternum rufulum, læve et nitidum. Pedes breves et luridi.

♂. Cephalothorax scutaque abdominalia lurida, lævia et nitida, ille convexior, hæc longiora et apicem abdominis attingentia. Partes oris valde singulares, laminæ nigro-marginatæ et apice uncatæ. Pedes-maxillares nigri, parvi et curvati, femore nodoso, supra late convexo, subtus bimucronato, patella tibiaque æquilongis, tarso parvo, bulbo cylindraceo, subanguloso, apice oblique truncato.

Ceylon : Galle !.

Gamasomorpha arabica, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax sat longe ovatus, parum convexus, fusco-rufescens, in medio longitudinaliter dilutior, utrinque subtiliter sed crebre coriaceo-rugosus

et pilis crassis albis conspersus. Oculi postici in lineam evidenter recurvam, medii a lateralibus distincte separati. Oculi antici spatio oculo saltem haud angustiore a sese distantes. Abdominis scuta sternumque obscure rufula, dense et tenuiter coriaceo-rugosa et pilis cinereo-albidis pronis et leviter lanceolatis, conspersa. Pedes breves et robusti, fulvo-rufuli. Pedes-maxillares fulvi, femore robusto, patella tibiaque brevibus subæquis, tarso sat anguste ovato, bulbo mediocri et cylindraceo, spina arcuata, lobo circiter æquilonga, munito.

Aïn-Mouça, prope Suez !.

G. camelina, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, versus marginem sensim infuscatus et tenuiter nigro-marginatus, subtiliter et crebre striolatus, in medio sensim lævior et nitidus, apice obtuse emarginatus et minute bimucronatus. Oculi postici in lineam plane rectam, medii lateralibus paulo majores. Oculi antici spatio oculo non multo angustiore a sese distantes. Abdomen breve, scutis obscure rufulis, sublævibus, subtilissime rugosis et parce albido-pilosis, scuto dorsali integro et subrotundo, scuto ventrali tertiam partem apicalem haud superante et postice recte truncato. Sternum rufescens, nitidum, parce sed profunde punctato-impressum. Pedes flavo-rufuli, brevissimi et robusti, femoribus late clavatis, metatarsis anticis leviter fusiformibus, tarsis minutis, metatarsis brevioribus.

Singapore !.

G. inclusa Thorell (Ann. Gen., 1887, p. 29), ex Birmania valde affinis certe est sed verisimiliter distincta.

G. taprobanica, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax rufo-castaneus, versus marginem infuscatus et nigro-marginatus, valde et crebre rugoso-granulosus, vitta media lata lævi et nitida munitus, postice convexus et obtusus, haud mucronatus. Oculi postici in lineam leviter recurvam, subrotundi, medii lateralibus paulo majores et inter se contigui sed a lateralibus angustissime separati. Oculi antici subrotundi, spatio oculo paulo latiore a sese distantes. Clypeus oculis anticis paulo angustior. Abdominis scuta rufo-castanea sat dense sed subtiliter rugoso-punctata, pilis plumosis cinereis conspersa, dorsale integrum, ventrale mamillas fere attingens et postice obtuse truncatum. Sternum rufulum, læve et nitidum, nec punctatum nec rugosum sed utrinque striis tribus obliquis, medium haud attingentibus, impressum. Pedes breves, luridi, coxis trochanteribusque rufulis, mediocres, tarsis cunctis minutis, metatarsis multo brevioribus.

♂. Feminæ subsimilis sed cephalothorace supra latius lævi. Pedes-maxillares breves, luridi; femore clavato et compresso; patella vix longiore quam latiore, parallela et convexa; tibia patella breviore et paulo angustiore; tarso cylindraceo, tibia cum patella longiore; bulbo cylindraceo, mediocri sed spina longissima arcuata et acuta munito.

Ceylon : Maturata !, Nuwara-Eliya !, Kandy !.

A *G. lucida* E. Sim., cui affinis est, præsertim differt cephalothorace utrinque magis ruguloso, impressionibus sterni, etc.

G. nigripalpis, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax rufo-castaneus, versus marginem sensim infuscatus, in medio lævis et nitidus, utrinque crebre striolatus, postice abrupte declivis et apice leviter emarginatus. Oculi postici in lineam subrectam, inter se contigui, medii lateralibus paulo majores. Oculi antici reliquis paulo majores, inter se spatio oculo plus duplo angustiore separati. Clypeus oculis anticis paulo angustior. Abdominis scuta obscure rufula, dorsale crebre et minute punctato-rugosum et pilis albidis simplicibus vestitum, ventrale lævius. Sternum rufulum, læve et nitidum, utrinque ad marginem incisuris parvis 2 vel 3 notatum. Pedes breves et robusti, fulvo-rufescentes.

♂. Cephalothorax, abdomen, pedesque feminæ. Partes oris singulares, laminæ nigro-marginatæ, intus ad apicem subacutæ et uncatæ. Pedes-maxillares fusci vel nigri; femore crasso et curvato, subtus grosse tuberculato; patella sat longa et tereti; tibia multo breviore et annuliformi; tarso tibia cum patella longiore, leviter arcuato, apice paululum ampliato et oblique secto; bulbo terminali, mediocri et obliquo cum angulo inferiore acute producto.

Ceylon : Kandy !, Colombo !.

Xestaspis tumidula, n. sp. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax læte fulvo-rufescens, fusco-marginatus, nitidus, parce et minute granosus, validissime convexus, antice longe declivis, postice abrupte verticalis et apice obtuse emarginatus. Oculi postici in lineam rectam, medii inter se plane contigui et lateralibus saltem 1/3 majores, laterales a mediis angustissime separati. Oculi antici mediis posticis vix majores, late ovati et transversi. Clypeus oculis anticis latior. Abdominis scuta fulva et nitida, crebre et subtiliter punctata. Sternum in medio leviter depressum, fulvum et nitidissimum, parcissime punctatum. Pars labialis fusco-castanea. Laminæ anormales, intus uncatæ, nigræ. Pedes luridi. Pedes-maxillares albido-testacei, breves; femore curto et recto; patella

tibiaque circiter æquilongis; tarso patella cum tibia simul sumptis longiore, angusto et acuminato; bulbo simplici, tereti, spina apicali parva munito.

♀. Cephalothorax humilior. Sternum sublæve. Partes oris fulvæ, normales.

Africa occid. : Sierra-Leone (Mocquerys).

A *X. hyperioni* E. Sim., cui affinis est, differt præsertim cephalothorace maris multo convexiore et laminis-maxillaribus uncatis.

X. parumpunctata, n. sp. — ♀. Long. 2,8 mill. — Cephalothorax læte rufescens, ad marginem infuscatus, nitidus, supra punctis paucis parvis, longitudinaliter seriatis, impressus, versus marginem subtiliter striato-rugosus. Oculi quatuor postici inter se contigui et lineam subrectam formantes, medii lateralibus paulo majores. Oculi antici ovati et obliqui, mediis posticis non multo majores. Clypeus oculis anticis angustior. Abdominis scutum dorsale rufulum, nitidum, parce et regulariter impresso-punctatum, parce et minute albido-pilosum, scutum ventrale parce et subtiliter rugoso-punctatum et longius pilosum, postice mamillas haud attingens et recte sectum. Sternum sat longum, læte rufulum, nitidum, punctis impressis, versus marginem sensim densioribus, conspersum. Pedes luridi, metatarsis quatuor anticis levissime ovatis.

Africa occid. : Sierra-Leone (Mocquerys).

X. sublævis, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, subtiliter coriaceus, sublævis. Oculi quatuor postici inter se contigui et lineam rectam formantes, medii lateralibus evidenter majores. Oculi antici subrotundi, mediis posticis vix majores. Clypeus oculis anticis paulo latior. Abdominis scuta obscure fulvo-olivacea vel rufula, subtilissime coriacea, sublævia et albido-pilosa, dorsale apicem haud attingens et postice rotundatum, ventrale abbreviatum, tertiam partem apicalem ventris haud superans et postice truncatum. Sternum latum et convexum, fulvum et læve, subtilissime coriaceo-reticulatum. Pedes luridi, sat longi et graciles, patellis sat longis, metatarsis cunctis tenuibus et tarsis multo longioribus.

Ceylon : Colombo !, Matale !.

Familia **DYSDERIDÆ.**

Segestria sæva Walck., *Apt.*, I, 1837, p. 269. — *? Segestria Suteri* Urquhart, *Trans. N. Z. Inst.*, XXIV, 1891, p 230.

Long. 15 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, postice sensim dilutior, albido-pubescens. Oculi quatuor antici magni et subæquales, medii a sese contigui a lateralibus anguste separati. Clypeus oculis lateralibus anticis plus duplo angustior. Abdomen longe oblongum, fulvo-testaceum, maculis magnis subquadratis rufo-brunneis 7 vel 8 biseriatis et utrinque lineis fuscis exilibus et obliquis supra ornatum. Chelæ fusco-rufulæ, longe et crebre pilosæ. Pedes rufo-brunnei, antici obscuriores. Tibiæ metatarsique quatuor anteriores subtus longe pilosi, tibiæ 1i paris aculeis inferioribus 4-4 aculeoque medio et utrinque aculeis trinis instructæ.

Nova-Zealandia (Quoy et Gaymard).

Je donne cette description d'après le type même de Walckenaer, qu fait partie des collections du Muséum.

Ariadna segmentata, n. sp. — ♀. Long. 13 mill. — Cephalothorax ovatus, subparallelus, obscure fusco-rufescens, sericeo-pubescens. Oculi inter se subæquales, quatuor postici, superne visi, lineam evidenter procurvam formantes, medii inter se contigui sed a lateralibus late distantes. Clypeus oculis anticis paulo latior. Abdomen oblongum, albido-testaceum, vittis transversis nigris 5 vel 6, leviter sinuosis et in medio acute ampliatis, supra decoratum, subtus obscure virescenti-testaceum et longitudinaliter infuscatum. Chelæ, sternum et partes oris fusco-rufula, lævia. Pedes fulvi, antici, præsertim tibiis et metatarsis, obscuriores. Femur 1i paris intus ad apicem convexum et pluriaculeatum. Tibiæ anticæ aculeis numerosis, parum regulariter pluriseriatis et metatarsi aculeis inferioribus numerosis biseriatis instructi. Tibiæ metatarsique quatuor postici aculeis sat numerosis et pluriseriatis instructi.

Tasmania : Lauceston (Simson).

Cette espèce remarquable s'éloigne des formes typiques du genre par plusieurs caractères exceptionnels, notamment la courbure en arrière (*procurva*) de la ligne oculaire, et les pattes postérieures armées d'épines nombreuses, etc.

Rhode biscutata, n. sp. — ♂. Long. 5 mill. — *R. scutiventri* E. Sim affinis. Cephalothorax subsimilis, nigro-rufescens, grosse punctato-reticulatus, fronte latiore et area oculorum dimidium latitudinem frontalem tantum occupante. Oculi quatuor postici in lineam subrectam, medii lateralibus paulo minores, inter se subcontigui sed a lateralibus distinctius separati. Oculi antici reliquis majores et subrotundi. Sternum nigro-rufulum, crebre et grosse reticulato-areolatum. Abdomen anguste

elongatum, albo-testaceum, scutis rufulis, subtiliter coriaceis, parce et minute granosis et pilosis, et supra et infra obtectum, scuto dorsale oblongo, dimidium dorsum superante, ovato et postice obtuso, scuto ventrale maximo, mamillas fere attingente, postice leviter attenuato et truncato. Pedes longi et sat graciles, fulvo-rufescentes, antici posticis paulo obscuriores et saltem femoribus paulo crassiores. Pedes-maxillares sat longi; patella convexa, longiore quam latiore; tibia patella paulo longiore et cylindracea; tarso tibia multo longiore et graciliore; bulbo simplici elongato-ovato, apice minute uncato [haud abrupte setiformi ut in *R. scutiventri* (1)].

♀. Long. 4,8 mill. — Mari subsimilis, sed abdomine supra haud scutato, subtus scuto epigasteris læviore et abbreviato rimam non multo superante.

Alg. orient. : Edough !.

Familia **CAPONIIDÆ.**

Nops Mathani, n. sp. — ♀. Long. 7,5 mill. — Cephalothorax crebre coriaceo-rugosus, læte rufo-castaneus, linea marginali exillima maculaque oculari nigris notatus. Oculi magni, spatio dimidio oculo haud latiore inter se distantes. Clypeus fere directus, oculis plus triplo latior. Abdomen longe oblongum, teretiusculum, supra atrum, parum dense et sat longe albido-pilosum, macularum magnarum testacearum seriebus duabus vel vittis duabus sinuosis notatum, subtus omnino pallide testaceum vel leviter virescens. Sternum rufo-castaneum, validissime coriaceo-rugosum. Pedes læte rufo-aurantiaci, metatarsis tarsisque cunctis et coxis posticis dilutioribus et pallide flavis, metatarsis tarsisque anticis ut in *N. variabili* Keyserl. Pedes-maxillares pallide flavi, tarso evidenter incrassato, longe oblongo, inferne crebre cinereo-crinito.

Brasilia : prov. Amazonas : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

(1) *R. scutiventris* E. Sim., qui a été découvert au col de Pajares, dans les Asturies, par Ch. de la Brûlerie, m'a été envoyé en nombre de plusieurs points du Portugal, et je l'ai trouvé moi-même, près d'Oran, dans les mousses des plantations de Pins du fort de Santa-Cruz.

Familia **PRODIDOMIDÆ.**

Prodidomus penicillatus, n. sp. — ♂. Long. 2,5 mill.; ♀, long. 3—3,5 mill. — Læte flavidus, lævis, parce albo-pilosus, abdomine albo-testaceo. A *P. flavido* E. Sim. differt oculis minoribus et aream longiorem occupantibus, anticis nigris reliquis paulo majoribus, oculis posticis valde elongatis, obliquis, apice distinctius separatis, mamillarum lateralium fusulis longioribus, penicillatis fere *Zimiris*, tibiis posticis inferne aculeis setiformibus uniseriatis trinis armatis, pedum-maxillarium maris tarso multo minore ovato, patella tibiaque paulo longioribus et tibia extus ad apicem apophysi simplici sat longa et acuta armata.

Algeria occid. : Mecheria !.

Familia **DRASSIDÆ** (1).

Anagraphis pallens, n. sp. — Long. 8 mill. — Cephalothorax pallide luridus, pilis longis et pronis albo-sericeis vestitus, stria thoracica brevi. Area oculorum mediorum paulo longior quam latior. Abdomen anguste oblongum, pallide cinereum, albo-sericeo-pubescens, antice truncatum et setis crassis, cinereis munitum. Chelæ, partes oris, sternum, pedes-maxillares pedesque pallide lurida, aculeis pedum nigris longis et numerosis. Pars labialis sat longa, dimidium laminarum paulo superans. Chelarum margo inferior dentibus trinis minutissimis munitus. Pedes-maxillares minuti; femore subrecto, nigro-aculeato; patella vix longiore quam latiore, subquadrata et aculeata; tibia patella breviore, apice oblique secta, extus late producta atque apophysi gracili, longa et acuta, antice recte directa, sed ad apicem extus inflexa, armata; tarso sat longe ovato; bulbo simplici, discoidali, stylo crasso omnino circumdato.

Caput Bonæ-Spei !.

Megamyrmecion californicum, n. sp. — ♀ (pullus). Long. 7 mill. — Cephalothorax luteo-ravidus, nitidus, haud marginatus, pilis albidis conspersus. Oculi postici in lineam valde procurvam, subæquales (medii vix majores), medii obtuse triangulares, inter se anguste sejuncti,

(1) Pour les genres *Anagraphis, Latonigena* et *Setaphis*, cf. E. Sim., Hist. nat. des Ar., 2e éd., I, fasc. 2.

laterales elongati et obliqui, a mediis spatio oculo paulo angustiore distantes. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii majores, laterales subrotundi. Clypeus oculos laterales anticos circiter æquans. Abdomen oblongum, depressiusculum, antice obtuse truncatum, fulvo-cinereum, postice leviter violaceo-tinctum, albido-cinereo-pubescens. Sternum pedesque omnino lurida. Tibiæ anticæ inferne aculeis 1-2, metatarsi aculeis basilaribus binis tantum armati. Pedes postici numerose aculeati. Tarsi metatarsique antici rare scopulati. Tibiæ quatuor posticæ aculeo dorsali unico subbasilari instructæ. Tibia cum patella 4[1] paris cephalothorace multo longior. Mamillæ inferiores longissimæ, teretes, superiores infuscatæ, graciliores et circiter 1/3 breviores.

California merid.

Aphantaulax australis, n. sp. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax nigerrimus, lævis et nitidissimus, pilis longis albidis, vittam mediam latam formantibus, supra ornatus. Oculi postici parvi, æqui, plani, in lineam rectam, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores et spatio oculo saltem triplo latiore sejuncti. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus duplo majores, inter se disjuncti sed a lateralibus haud separati. Clypeus oculis lateralibus anticis saltem triplo latior. Abdomen oblongum, antice rotundum, postice obtuse truncatum, supra duriusculum, nigerrimum et nitidissimum, cinereo-pubescens, antice macula magna, prope medium utrinque macula elongata transversa, postice, supra mamillas, macula transversa, niveo-pilosis decoratum, subtus atro-testaceum. Sternum nigro-nitidum. Pedes atri, sat longe setosi, metatarsis tarsisque paulo dilutioribus et olivaceis. Tibia 1[1] paris inferne, prope medium et ad marginem interiorem uniaculeata et in parte basilari aculeo interiore unico armata. Metatarsi quatuor antici, prope basin, biaculeati. Scopulæ longæ et raræ. Pedes-maxillares sat robusti et breves, olivacei; patella paulo longiore quam latiore; tibia patella paulo breviore, haud angustiore, fere quadrata, extus ad apicem apophysi articulo vix breviore, antice recte directa, ad basin sat crassa, ad apicem acutissima armata; tarso anguste ovato, subtereti; bulbo simplici elongato.

Africa austr. : Port Elizabeth.

Pœcilochroa latefasciata, n. sp. — ♀ (pullus). Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, nitidissimus, longe et parce albido-pilosus. Abdomen oblongum, nigrum, cinereo-pubescens, antice arcu lato, paulo ante medium vitta transversa lata recurva, postice macula maxima subtra-

pezoidali niveo-pilosis decoratum, subtus atro-testaceum, parcius cinereo-pilosum. Sternum nigro-nitidum. Pedes sat breves et robusti, coxis olivaceis, femoribus nigris, anticis intus late testaceo-plagiatis, reliquis articulis fulvo-olivaceis, tibiis posticis ad basin metatarsisque leviter infuscatis. Tibiæ quatuor anticæ subtus, in parte secunda, aculeo interiore atque aculeo apicali armatæ. Metatarsi antici aculeo parvo unico basilari tantum armati. Scopulæ sat densæ.

Peruvia orient. : Pebas (de Mathan).

Latonigena auricomis, n. sp. — ♀. Long. 11 mill. — Cephalothorax niger, pilis sordide albidis flavidisque conspersus. Oculi postici in lineam subrectam (levissime recurvam), medii lateralibus minores et inter se quam a lateralibus remotiores. Oculi medii antici spatio oculo circiter duplo angustiore a sese distantes a lateralibus vix separati et paulo majores. Clypeus oculis anticis saltem dimidio latior. Abdomen sat late oblongum, atrum, antice arcu transverso, paulo ante medium vitta transversa sat angusta et leviter sinuosa, postice vitta latissima læte flavo-pilosis decoratum, subtus nigrum, parce cinereo-pilosum. Pedes breves et robusti, femoribus nigris, reliquis articulis obscure fusco-rufescentibus, breviter albido-pilosis, tibiis anticis aculeis inferioribus 3-2, metatarsis aculeis binis armatis, tibia 3i paris aculeo dorsali subbasilari munita sed tibia 4i paris aculeo dorsali carente. Chelæ sat longæ et attenuatæ, nigro-nitidæ, in parte basali parce crinitæ et levissime transversim rugatæ. Plaga vulvæ sat magna, antice truncata et lobata, postice sensim ampliata, in medio longitudinaliter biimpressa.

Buenos-Ayres.

Setaphis sexmaculata, n. sp. — ♂. Long. 5—6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, nigro-marginatus, subtiliter coriaceus et pilis longis pronis albo-sericeis parce vestitus, stria thoracica sat longa impressus. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus saltem 1/3 minores. Oculi medii postici elongati et obliqui, inter se quam a lateralibus multo remotiores. Chelæ, partes oris sternumque fusco-rufescentia, nitida, parce et minute punctata et pilosa. Abdomen anguste et longe oblongum, nigro-nitidum, micanti-tinctum, supra antice maculis binis rotundis et prope medium maculis binis majoribus transversis, subtus maculis majoribus ovato-longitudinalibus et extus ampliatis, albidis et niveo-pilosis eleganter decoratum. Pedes luridi, femoribus (anticis usque ad basin, posticis tantum ad apicem), patellis tibiisque late nigro-variatis et subvittatis, tibiis anticis fere nigris, reli-

quis paulo robustioribus et longius crinitis. Pedes 1i paris omnino mutici. Pedes 2i paris aculeis basilaribus metatarsorum tantum armati. Pedes postici numerose aculeati. Tarsi metatarsique antici rare scopulati, tarsi postici nec scopulati nec fasciculati, subtus valde criniti. Pedes-maxillares fusco-rufescentes, patella dilutiore; femore robusto; patella paulo longiore quam latiore; tibia patella longiore, apophysi apicali articulo longiore, antice directa, acuta et sursum curvata instructa; tarso bulboque magnis et convexis.

♀. Mari subsimilis. Area vulvæ antice fovea transversim semicirculari, postice plagula lævi rufula vel nigra, utrinque convexa, in medio canaliculata, munita.

Africa australis : Kymberley !, Vryburg !.

Sergiolus variegatus Hentz. — ♀. Long. 5—6 mill. — Cephalothorax læte fulvo-rufescens, nitidissimus, longe et parum dense niveo-pilosus. Oculi postici inter se fere æquidistantes. Abdomen anguste oblongum, postice truncatum, nigro-nitidum, obscure cinereo-pubescens, antice utrinque macula magna, prope medium vitta transversa integra, ad apicem, supra mamillas, macula transversa niveo-pilosis supra decoratum, subtus vitta alba lata, mamillas haud attingente, notatum. Mamillæ longæ, nigræ. Sternum, partes oris, chelæ pedesque fulvo-aurantiaca, metatarsis posticis infuscatis. Tibia 1i paris aculeo apicali parvo tantum armata. Tibia 2i paris inferne aculeo apicali atque aculeo submedio instructa. Metatarsi quatuor antici aculeis subbasilaribus binis muniti. Scopulæ longæ sat remotæ. Pedes postici numerose aculeati. Area vulvæ fusca, coriacea, postice fovea transversa profunda, plus triplo latiore quam longiore et in medio leviter constricta, impressa.

Amer. sept. : Georgia.

S. cyaneiventris, n. sp. — ♀. Long. 6,5 mill. — Præcedent valde affinis. Cephalothorax obscurius fulvo-rufescens, nitidissimus, parce albido-pilosus. Oculi medii postici inter se quam a lateralibus remotiores. Abdomen nigrum, supra obscure fulvo-cinereo-pubescens, antice pilis albis paucis ornatum, subtus nigro-cyaneum et parcius pilosum. Sternum et partes oris obscurius rufescentia. Pedes fulvo-rufescentes, antici leviter infuscati, aculeis ut in præcedenti sed tibia antica aculeo interiore in parte basali munita. Area vulvæ fovea minore semicirculari et profunda impressa.

Florida.

Laronia cincta, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, subglaber et sublævis. Oculi antici inter se subcontigui, medii lateralibus paulo minores. Oculi postici inter se fere æque et parum late distantes. Abdomen atrum, atro-sericeo-pubescens, prope medium vitta transversa lata albido-testacea ornatum. Sternum, partes oris, pedesque fusco-olivacea, coxis, trochanteribus, patellis ad basin, metatarsis tarsisque dilutioribus et fulvis, tibiis anticis subtus aculeis tenuibus uniseriatis tribus, metatarsis aculeis multo minoribus, ad basin atque ad apicem binis, armatis. Chelæ *L. variegatæ*. Plaga vulvæ nigra, subquadrata, obtuse sulcata et antice tuberculis ovatis humilibus binis notata.

Africa occid. : Sierra-Leone.

Familia **PALPIMANIDÆ** (1).

Palpimanus transvaalicus, n. sp. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax, sternum, chelæ scutumque epigasteris nigro-rufula. Cephalothorax dense coriaceo-granulosus, pilis longis pronis sordide albidis vestitus. Abdomen lividum, cinereo-pubescens, scuto epigasteris postice obtuso, haud emarginato, antice transversim rugato. Sternum et pars labialis granulosa. Laminæ dilutiores et læves. Pedes antici rufuli, fere *P. gibbuli*, sed crista tibialis basin articulum haud attingente, tarso metatarso longiore, ovato et valde appendiculato. Pedum-maxillarium tibia patella saltem 1/3 longior, multo crassior, late ovata, tarsus tibia haud brevior, apice valde attenuatus et crinitus.

Transvaal : Makapan!.

P. capensis, n. sp. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax oblongus, postice abrupte declivis, niger, crebre coriaceo-granulosus, pilis crassis longis, pronis, albidis, parum dense et uniformiter vestitus. Oculi antici in lineam validissime procurvam semicircularem, medii lateralibus plus duplo majores. Oculi postici in lineam sat recurvam, medii a lateralibus quam inter se remotiores. Area oculorum mediorum longior quam latior, antice quam postice angustior. Abdomen breviter ovatum, rufulo-testaceum, scuto epigasteris obscure-rufo, duriusculo, antice transversim striolato, postice sublævi. Sternum nigrum, crebre et grosse granulosum. Pedes fere *Palpimani gibbuli* sed tarsis anticis paulo minus appendiculatis et intus minus distincte cristatis, metatarsis paulo

(1) Pour les genres *Boagrius*, *Anisaedus* et *Diaphorocellus*, cf. E. Sim., Hist. nat. des Ar., 2e éd., I, fasc. 2.

longioribus. Pedes antici crassi, nigro-rufescentes, reliqui ferruginei. Pedes-maxillares ferruginei; femore gracili et subrecto; patella parva et gibbosa; tibia patella duplo longiore, crassiore et ovata; tarso tibia paulo breviore et multo angustiore, apice acuminato; bulbo simplici.

♀. Long. 10 mill. — Mari fere similis sed parte cephalica in medio crebrius albo-pilosa, scuto epigasteris validius transversim striolato, tarsis metatarsisque pedum anticorum intus, longe et crebre scopulato-cristatis.

Africa australis : Caput Bonæ-Spei!, Matjesfontein !, Port-Elizabeth.

P. globulifer, n. sp. — ♂. Long. 6 mill. — A præcedenti, cui affinis est, differt cephalothorace paulo humiliore, antice magis attenuato, fronte angustiore, utrinque parum dense cinereo-piloso, supra vitta latissima crebrius albo-pilosa notato, oculis posticis majoribus, lineam minus recurvam formantibus, mediis a lateralibus quam inter se parum remotioribus, area oculorum mediorum parallela et non multo longiore quam latiore, sterno latiore, tarso pedum anticorum intus longius cristato, pedum-maxillarium tibia multo majore insigniter inflata, globosa et nitida.

Africa austr. : Port-Elizabeth.

Sarascelis Raffrayi, n. sp. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax modice et regulariter convexus, nigro-rufescens, tenuiter et crebre rugosus, pilis cinereis longis conspersus. Oculi medii postici rotundi, spatio oculo plus triplo latiore a sese distantes. Oculi medii antici posticis saltem triplo majores, nigri, convexi et rotundi. Area mediorum subparallela et latior quam longior. Clypeus area mediorum multo latior, verticalis et subplanus. Abdomen oblongum, fusco-testaceum, sat longe et crebre cinereo-pubescens, plagula epigasteris rufula, tenuissime transversim striolata, postice recte secta et dimidium ventris haud attingente munitum. Sternum nigro-rufulum, crebre grosse et uniformiter granosum. Chelæ nigro-rufescentes, nitidæ, parcissime rugosæ. Pedes antici rufo-castanei, fimbria interiore tibiæ, metatarsi tarsique sat longa et nigro-sericea, patella tibia longiore et paulo crassiore fusiformi, tarso metatarso longiore versus basin attenuato. Pedes-maxillares lutei, femore brevi et gracili, patella parva nodiformi, tibia magna valde convexa et globosa, tarso tibia longiore sed multo angustiore, parallelo et leviter curvato, bulbi lobo rufulo magno, depressiusculo, apophysi apicali robusta nigra, curvata et falciformi.

Singapore !.

Boagrius pumilus, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax brevis et valde convexus, antice et præsertim postice valde declivis, rufulus, subtiliter et crebre coriaceus, tenuiter nigro-marginatus. Oculi inter se valde iniqui, medii antici reliquis plus sextuplo majores. Oculi quatuor antici in lineam plane rectam. Oculi medii postici minutissimi inter se remotissimi. Area mediorum subparallela et multo latior quam longior. Clypeus area mediorum latior, verticalis et subplanus. Abdomen breviter ovatum, fulvo-testaceum, cinereo-pubescens, plagula epigasteris rufula, subtiliter coriacea, postice truncata et leviter emarginata, dimidium ventris haud attingente, notatum. Sternum rufulum, subtiliter et creberrime granulosum. Chelæ rufulæ, subtilissime coriaceæ, sublæves. Pedes lutei, antici fimbria interiore tibiæ, metatarsi tarsique sat longa et cinerea, tibia antica patella paulo longiore et leviter fusiformi, tarso metatarso multo longiore, gracili et tereti. Pedes-maxillares lutei, tibia patella longiore et crassiore, tarso acuminato tibia breviore.

Singapore!.

Anisædus Gaujoni, n. sp. — ♂. Long. 9 mill.; ♀. 8,5 mill. — Cephalothorax nigro-piceus, subtiliter coriaceo-rugosus, sat longe cinereo-pilosus. Abdomen ovatum, depressiusculum, rufo-lividum, creberrime testaceo-punctatum seu guttulatum, guttulis in medio inordinatis, in lateribus et postice zonas transversas, recurvas, numerosas formantibus. Venter fulvo-testaceus, plagula epigasteris duriuscula, rufula, sat parva, antice transversim striolata, postice foveis binis obliquis impressa. Sternum nigro-piceum, valde et crebre granulosum. Chelæ nigræ, extus inæqualiter rugatæ, intus sublæves sed valde transversim striatæ. Pedes fere *Palpimani*, rufo-picei, antici reliquis obscuriores.

♂. Pedes-maxillares femore sat gracili, parallelo et leviter curvato, patella non multo longiore quam latiore, tibia patella saltem 1/3 longiore, paulo latiore et leviter ovata, tarso tibia cum patella haud breviore, multo angustiore, subtereti, versus apicem leviter incrassato et supra crasse piloso, bulbo fulvo-nitido, maximo, tarso multo latiore, subgloboso, apice spina laciniosa parva et uncata munito.

♀. Pedes-maxillares sat graciles, fulvo-rufuli, apice sensim infuscati, tibia patella multo longiore, tarso tibia nec longiore nec crassiore, acuminato, intus longissime et parce, extus breviter et crasse, nigro-piloso.

Ecuador : Amazula (Gaujon).

Diaphorocellus biplagiatus, n. sp. — ♀. Long. 4.5 mill. — Ce-

phalothorax oblongus, modice convexus, læte castaneo-rufescens, utrinque nigricans, supra parce, versus marginem creberrime, punctato-rugosus. Abdomen anguste oblongum, supra atrum, cinereo-pilosum, maculis magnis ovatis albo-testaceis binis ornatum (altera basali, altera minore apicali), subtus fulvo-testaceum, regione epigasteris duriuscula, rufo-castanea et lævi, versus pediculum subtiliter transversim rugata. Sternum obscure fusco-rufulum, valde, crebre et uniformiter granulosum. Chelæ fusco-rufulæ, asperæ et parce granulosæ. Pedes antici læte rufescentes, femoribus latissime compressis, reliquis articulis sat gracilibus, patella et tibia longitudine subæqualibus, tibia paulo graciliore et apicem versus attenuata, metatarso brevissimo, tarso metatarso longiore et paulo crassiore. Reliqui pedes luridi, versus basin rufescenti-tincti.

Caput Bonæ-Spei !.

Familia **ZODARIIDÆ** (1).

Patiscus Peringueyi, n. sp. — ♀ (pullus). Long. 9 mill. — Cephalothorax angustus, elongatus, parum convexus, luridus, vitta marginali et, in parte cephalica, vitta media augusta nigricantibus ornatus. Abdomen longe cylindraceum, antice posticeque rotundum, testaceo-olivaceum, parce et breviter nigro-pilosum, utrinque vitta albidiore, postice evanescente, marginatum et vitta media angusta obscuriore, postice ramosa, ornatum, utrinque nigricans, subtus pallidius sed vitta media obscuriore, vittam angustiorem albidam includente, notatum. Sternum fulvum, nigricanti-marginatum. Chelæ fulvæ, nigro-crinitæ. Pedes robusti, fulvi, femoribus ad apicem, patellis tibiisque plus minus olivaceo-variatis, metatarsis tarsisque anticis castaneis. Metatarsi antici inferne aculeis apicalibus binis parvis instructi, reliqui articuli omnino mutici. Tarsi antici longi et leviter ovati. Pedes-maxillares fulvi, apice rufuli, robusti, patella tibiaque crassis, brevibus et subæqualibus, tarso longiore, valde acuminato.

Caput Bonæ-Spei !.

Chariobas cylindraceus, n. sp. — ♀ (pullus). Long. 5,5 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, fusco-rufescens, nigro-marginatus, area oculorum nigra. Abdomen angustum et cylindraceum, supra nigri-

(1) Pour les genres *Patiscus*, *Chariobas*, *Caesetius* et *Hermippus*, cf. E. Sim., Hist. nat des Ar., 2e éd., I, fasc. 2.

cans : antice maculis parvis binis obliquis. prope medium maculis majoribus triquetris albidis et in parte apicali vitta media obscure testacea ornatum, subtus dilutius et testaceum. Sternum nigro-nitidum. Pedes flavi, metatarsis tarsisque anticis olivaceis. Pedes-maxillares olivacei, femore dilutiore.

Africa occ. : Gabon.

Cæsetius murinus, n. sp. — ♀. Long. 8,5 mill. — Cephalothorax breviter ovatus, valde convexus, parte thoracica nigra et subglabra, cephalica paulo dilutiore, rufescente, luteo-pilosa. Abdomen late ovatum, convexum, fusco-testaceum, nigricanti-punctatum et luteo-pilosum, antice vitta evanescente, prope medium punctis duobus albidioribus postice lineis transversis angulosis nigricantibus albido-marginatis, supra notatum, subtus dilutius et lineis fuscis quatuor, parum expressis, notatum. Sternum, chelæ, partes oris, pedesque fusco-rufescentia, parce albido et nigro pilosa, pedes postici valde et numerosissime aculeati. Area vulvæ nigra, fovea magna angulosa impressa.

Caput Bonæ-Spei !.

C. politus, n. sp. — ♀ (pullus). Long. 6 mill. — A præcedenti differt cephalothorace longiore, fusco-piceo, glabro et nitido, abdomine supra atro, sericeo-pubescente, subtus testaceo et vittis fuscis duabus notato, chelis, sterno, partibus oris pedibusque luridis, nitidis, laminis apice crebre denticulatis, pedibus posticis minus aculeatis, tarsis robustioribus metatarsis vix gracilioribus.

Transvaal !.

Hermippus loricatus, n. sp. — Pl. 7, fig. 1. — ♂. Long. 10 mill. — Cephalothorax crassus, valde convexus, parum attenuatus, antice posticeque fere æqualiter declivis et rotundus, ater, dense et tenuiter rugosus, pilis albidis brevibus vestitus. Oculi antici in lineam modice procurvam, medii reliquis oculis evidenter majores, inter se appropinquati sed a lateralibus late distantes. Oculi postici parvi, æqui, in lineam fere æqualiter procurvam. Oculi medii antici cum lateralibus posticis lineam subrectam formantes. Oculi quatuor medii aream subquadratam occupantes. Clypeus altissimus, verticalis, planus. Abdomen breviter ovatum, fuscum, albido-pubescens, supra in parte antica scuto ovato nigro tenuiter rugoso et biimpresso obtectum, subtus in regione epigasteris, scuto simili munitum. Chelæ nigræ, parce rugosæ et transversim inordinate rugatæ, ungue brevi recto, supra prope basin obtuse tuberculato. Sternum nigrum, tenuiter rugosum. Pedes parum longi, sat graciles, coxis femo-

ribusque atris, reliquis articulis obscure fusco-castaneis, cunctis breviter albido-pilosis, femoribus anticis intus prope apicem uniaculeatis, tibiis anticis inferne aculeis 3-3, metatarsis aculeis 4-4 armatis, tarsis parce scopulatis et breviter spinulosis. Pedes postici sat numerose aculeati. Pedes-maxillares breves et robustissimi; femore brevi, robusto et compresso; patella brevi, supra apophysi magna in parte basali verticali, dein extus perpendiculariter inflexa, cariniformi et apice truncata armata; tibia brevi extus apophysi majore sursum et secundum apophysem patellarem directa attenuata sed ad apicem leviter tumidula et uncata, antice ramulum gracile et curvatum emittente armata, tarso magno ovato convexo, bulbo maximo prominenti, lamina magna reniformi circumdato.

Africa centr. : Takora, prope lacuum Tanganyka.

Storena analis, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax sat elongatus, validissime convexus, fusco-piceus, nitidissimus. Oculi antici in lineam non multo procurvam, inter se parum et fere æque distantes, medii lateralibus plus triplo minores, laterales late ovati. Oculi postici æqui in lineam validissime procurvam, medii inter se subcontigui sed a lateralibus latissime remoti. Abdomen ovatum, nigrum et nitidum, leviter æneo-tinctum, parce et tenuiter pilosum, postice, supra mamillas, macula albo-opaca ornatum, in feminis junioribus supra maculis albidis sex, biseriatim ordinatis, notatum, subtus omnino atrum. Sternum læve, fusco-rufescens. Pedes fulvo-rufescentes, coxis femoribusque ad basin et tibiis anticis, in parte secunda, dilutioribus, femoribus in parte apicali sensim infuscatis. Tibia 1[i] paris, prope basin, aculeo setiformi unico, tibia 2[i] paris aculeis similibus duobus subtus instructæ, metatarsi quatuor antici aculeis paucis brevioribus et robustioribus muniti. Pedes postici valde aculeati. Plaga vulvæ postice fovea latiore quam longiore ad marginem anticum recte truncata, postice coarctata et utrinque ciliata, et antice plagulam transversim semilunarem includente, notata.

Ecuador : Los Puentes, prope Quito.

Suffucia septemmaculata, n. sp. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax lævis, nitidus et glaber, læte rufescens, antice et utrinque sensim infuscatus et macula media nigricanti subtriquetra et antice trifida notatus. Abdomen subrotundum, supra nigrum, nitidissimum et parce pilosum, maculis biseriatis albo-testaceis sex (posticis reliquis minoribus) et postice, supra mamillas, macula magna et ovata decoratum,

in lateribus et subtus albo-testaceum, utrinque parte alba dentata, regione epigasteris fulvo-tincta. Sternum fulvum, læve et nitidum. Pedes graciles et longi, luridi, femoribus ad basin atque ad apicem tibiisque ad basin, præsertim posticis, angustissime fusco-cinctis. Pedes-maxillares sat breves et robusti, rufescentes, femore robusto et compresso, subtus, prope medium, convexo, patella convexa, nodosa, non multo longiore quam latiore, tibia patella breviore et paulo latiore, superne ad angulum exteriorem apophysi nigra, antice directa et leviter uncata armata, tarso maximo et ovato, bulbo magno et complicato.

Saïgon !.

A *S. helophila* E. Sim., cui valde affinis est, præsertim differt pictura abdominis et pedum-maxillarium maris, multo minorum, structura.

Familia **PHOLCIDÆ** (1).

Metagonia bifida, n. sp. — ♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax pallide luridus, parte thoracica lineolis fuscis binis, postice valde divaricatis, ornata. Oculi sex, magni, nigro-cincti, spatio interoculari oculo non multo latiore. Abdomen cephalothorace circiter duplo longius, postice sensim ampliatum et truncatum, cum angulis turbinatis et productis. Sternum pedesque pallide lurida, femoribus tibiisque annulis angustis binis fusco-rufulis, altero subbasilari altero subapicali, ornatis. Plaga genitalis maxima, dimidium ventris superans, convexa, valde transversim rugata.

Brasilia : Prov. Rio.

Systenita prasina, n. sp. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax pallide luridus, clypeo chelisque antice late infuscatis. Oculi sex, utrinque tres mediocres semicirculum intus apertum formantes. Abdomen oblongum, læte viride, parce albo-setosum, mamillis infuscatis. Sternum latissimum, pedes longissimi, pallide lurida, patellis apiceque tibiarum anguste fuscis. Chelæ breves et latæ, depressæ, sed intus ad basin carina crassa obliqua et obtuse dentata munitæ. Pedes-maxillares luridi, femore apice crasso, ad basin valde attenuato et claviformi, patella brevi, tibia magna et globosa, apophysi tarsali longa, apice nigra fere setiformi et curvata.

(1) Pour les genres *Metagonia, Systenita, Leptopholeus, Priscula, Physocyclus, Mecolaesthus, Litoporus, Coryssocnemis, Modisimus, Hedypsilus,* cf. E. Sim., Hist. nat. des Ar., 2e éd., I, fasc. 2.

♀. Mari similis sed cephalothorace chelisque omnino luridis. Plaga genitalis parva, simplex, rimam epigasteris haud superans.

Venezuela!

Leptopholcus signifer, n. sp. — ♂. Long. 7 mill. (ceph.th. 1 mill., abd. 6 mill.). — Cephalothorax paulo latior quam longior, albido-testaceus, parte cephalica macula fusca triquetra obtecta, parte thoracica, in parte secunda, macula fusca maxima, antice angulosa, notata. Clypeus fuscus, longus et porrectus, ad marginem acuminatus et dente medio instructus. Abdomen cylindraceum, longissimum, apice truncatum, albido-testaceum, supra maculis nigris, fere inordinatis, series duas designantibus, ornatum. Chelæ testaceæ, muticæ. Sternum pedesque albido-testacea, apice femorum et tibiarum patellisque anguste nigris. Pedes-maxillares albido-testacei, femore patellaque olivaceis, apophysi tarsali fusco-rufula; trochantere angusto et longo, apice dente exteriore parvo denteque medio multo majore obtuso atque ad basin subarticulato munito; femore brevi et robusto, subtus valde convexo, extus prope basin minute dentato; patella convexa; tibia femore longiore, late ovata, sed apice attenuata; apophysi tarsali longa, sinuosa et valde crinita, apice membranaceo-laciniosa et intus dentata; bulbo globoso, intus apophysibus binis magnis, compressis et securiformibus instructo.

♀. Cephalothorax haud longior quam latior, parte cephalica haud maculata. Plaga genitalis rimam vix superans, subrotunda, simplex, rufula et subtiliter striata. Pedes-maxillares albi, tarso tibia cum patella circiter æquilongo, acuminato.

Africa occid. : Congo.

Priscula gularis, n. sp. — Long. 5—6 mill. — Cephalothorax luridus, ad marginem paulum infuscatus, parte cephalica clypeoque fusco-castaneis, regione oculorum crinita, oculis lateralibus nigricanti-marginatis. Abdomen altissimum, fere *Artemæ*, fulvo-olivaceum, supra crebre et inordinate nigricanti-punctatum sed antice in declivitate vitta lanceolata dilutiore notatum, subtus testaceum, plagula epigasteris coriacea et rufula munitum. Sternum, partes oris pedesque fulvo-rufescentia, femoribus tibiisque apice sensim obscurioribus atque annulo lato subapicali dilutiore notatis, pilis tenuibus longis conspersa. Chelæ antice deplanatæ, extus, prope medium, dente nigro parvo armatæ. Pedes-maxillares maximi; coxa mutica; trochantere parvo subtus breviter prominenti et subgloboso; femore maximo, versus apicem valde ampliato et truncato, late claviformi, subtus, prope articulationem, apo-

physi parva munito; patella brevi et transversa; tibia femore breviore et multo angustiore, apicem versus valde attenuata et mutica; apophysi tarsali tibia fere æquilonga, intus ad basin leviter dilatata et subglobosa, dein sat angusta, leviter curvata, apice nigra et abrupte angustiore; bulbo subgloboso, fulvo, apophysi apicali nigra, lobo paulo breviore, robusta et contorta.

♀. Mari subsimilis sed chelis muticis. Plaga vulvæ maxima, medium ventrem fere attingens, fusca, simplex, late semicircularis.

Ecuador : Quito.

Physocyclus Dugesi, n. sp. — ♂ ♀. Long. 5—6,5 mill. — Cephalothorax luridus, parte cephalica paulo obscuriore et linea media fusca notata, parte thoracica macula media magna dentata et utrinque maculis parvis tribus fuscis notata. Clypeus late infuscatus. Oculi fere *P. globosi* Tacz., sed medii antici a lateralibus distinctius separati. Abdomen fere *Artemæ*, altius quam longius, fulvo-testaceum, postice in declivitate fusco-atomarium, sat longe fulvo-pilosum. Sternum pedesque obscure lurida, sat longe pilosa, femoribus tibiisque annulo subapicali fusco vix expresso notatis, femoribus versus basin sensim incrassatis. Chelæ fere *Artemæ*, antice leviter depressæ et parce granosæ, extus carina nigra crassa abbreviata et apice acuta, munitæ. Pedes-maxillares magni ; femore late clavato, sed ad basin valde attenuato; patella brevissima annuliformi; tibia femore breviore, convexa sed apice valde attenuata; apophysi tarsali nigra, ad basin sat crassa et cylindrata sed ad apicem tenui flexuosa et acutissima; bulbo magno, lobo ovato fulvo, spina crassa fusca lanceolata.

♀. Mari subsimilis sed chelis muticis. Cephalothorax postice nec elevatus nec cornutus. Plaga vulvæ maxima, nigra, fere *Artemæ*, medium ventrem attingens.

Mexicum : Guanajuato (Dugès).

A *P. globoso* Tacz. (*gibboso* Keyserl.) imprimis differt cephalothorace in utroque sexu simili et normali haud cornuto.

Mecolæsthus longissimus, n. sp. — ♂ ♀. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fulvus, clypeo vittis duabus ad maginem confluentibus, parte thoracica vitta lata apice truncata, nigricantibus, ornatus. Sternum olivaceum, antice infuscatum. Chelæ fuscæ, maris dente parvo submedio instructæ. Abdomen longissimum, viride, supra lineis exilibus binis, subtus vitta, extremitates haud attingente, nigricantibus, ornatum. Pedes longissimi, fusci, femoribus tibiisque apice albido-annulatis. Pedum-

maxillarium maris lamina antice mucronata, femur crassissimum subtus excavatum, a basi atque ad apicem dentatum, tibia femore non multo brevior, supra deplanata, apophysis tarsi arcuata.

Venezuela !.

Litoporus aerius, n. sp. — ♂. Long. 1,5 mill. — Cephalothorax sternumque albido-testacea. Abdomen subglobosum, læte prasinum. Pedes longissimi, olivacei, femoribus ad apicem anguste, tibiis late albo-annulatis. Chelæ depressæ, antice, prope basin, carinula nigra, transversa, elevata, et prope medium dente minutissimo, instructæ. Pedum-maxillarium femur subtus valde gibbosum, tibia subglobosa, apophysis tarsalis maxima apice oblique secta et carinulata.

Venezuela !.

Coryssocnemis callaica, n, sp. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax obscure fulvus, parte cephalica nigricanti, parte thoracica vitta lata infuscata notata. Abdomen breviter oblongum, convexum, obscure virescens vel olivaceum, supra vitta media paulo dilutiore et dentata parum expressa notatum, subtus dilutius et macula media oblonga nigricanti ornatum. Sternum fulvum, antice confuse infuscatum. Pedes obscure fulvi, tibiis femoribusque versus apicem sensim infuscatis sed annulo apicali albido ornatis, femoribus 2[i] paris reliquis paulo robustioribus et subtus minute seriatim aculeatis. Laminæ-maxillares apice acuminatæ, antice ad basin obtuse tuberculatæ. Pedum-maxillarium femur subtus excavatum, ad basin atque ad apicem valde dentatum, tibia ovata, aphophysis tarsalis gracilis et recta.

♀. Vulva simplex, rimam parum superans, antice posticeque nigromarginata.

Venezuela !.

Je rapporte, avec doute, à ce genre l'espèce suivante dont la femelle seule est connue.

C. uncata, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax sternumque pallide lurida. Oculi nigro-cincti ordinarii. Abdomen globosum paulo altius quam longius fere *Psilochori*. Pedes pallide luridi, patellis fuscis, femoribus tibiisque annulo angusto fusco subapicali notatis. Tuberculum vulvæ subquadratum testaceum, unco gracillimo recto munitum.

Peruvia : Pebas.

Modisimus glaucus, n. sp. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax testaceus, lævis, haud marginatus, vitta media nigro-olivacea postice attenuata et sensim dilutiore, antice linea exili testacea longitudinaliter secta, notatus. Abdomen subglobosum, supra testaceo-viride, in parte basali maculis parvis nigris sex biseriatis (anticis rotundis, posticis arcuatis) in parte altera maculis majoribus binis denticulatis et parallelis ornatum, subtus in medio plaga genitali maxima, latiore quam longiore, utrinque truncata, flavo-rufula, antice tenuiter nigro-marginata, notatum. Pedes gracillimi, fusco-testacei, femoribus tibiisque annulo apicali angusto albo annuloque subapicali latiore fusco, ornatis.

Ins. S.-Domingo et ins. S.-Thomas.

Hedypsilus culicinus, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax latior quam longior, utrinque ample rotundus, postice latissime truncatus, pallide testaceus, subpellucens, vitta media antice bifida et utrinque maculis parvis submarginalibus olivaceis notatus, clypeo confuse obscuriore, in medio, prope marginem, spinam longam setiformem gerente, oculis nigris. Abdomen valde convexum, globosum, pallide viridi-testaceum, breviter pilosum, supra maculis obscurioribus vix expressis et biseriatis (6-6) notatum. Sternum, partes oris pedesque pallide testacea, pellucentia, parte labiali leviter infuscata, femoribus tibiisque apice vix distincte infuscatis. Pedum-maxillarium trochanter sat longus, ad basin valde attenuatus et subappendiculatus, femur et patella brevia et lata, tibia longior, teretiuscula et valde arcuata, apophysis tarsalis sat angusta et subrecta, bulbus maximus intus validissime globosus, leviter cordiformis, apophysi apicali styliformi curvata munitus.

Venezuela : Orinoco.

Familia **THERIDIIDÆ.**

Trithena flavolimbata, n. sp. — Pl. 7, fig. 3. — ♀. Abd., long. 4,2 mill.; lat. 5 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, prope marginem leviter fusco-reticulatus. Oculi postici parvi, æqui, fere æquidistantes, spatiis oculo plus duplo latioribus inter se distantes (in *T. tricuspidata* oculi medii inter se minus remoti). Oculi antici in lineam subrectam (in *T. tricuspidata* procurvam). Area mediorum trapeziformis (in *T. tricuspidata* subquadrata). Abdomen maximum, durinsculum, nitidissimum, triquetrum, aculeis trinis æquis longis et acutissimis ins-

tructum, supra albido-cinereum flavo-marginatum, aculeis flavis apice fuscis, punctis impressis fuscis sat parvis et subæquis munitum, mediis sex biseriatis (3-3) et utrinque lateralibus quatuor in seriem obliquam, subtus fusco-lividum, regione epigasteris et tuberculo mamillarum nigris. Sternum nigrum, vermiculato-coriaceum. Pedes pallide flavi, tarsis anticis fuscis, reliquis tarsis apice infuscatis.

Ecuador merid. : Loja (Gaujon).

T. biocellata, n. sp. — Pl. 7, fig. 4. — ♀. Abd., long. 3,5 mill.; lat. 3, 4 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, versus marginem infuscatus. Oculi postici mediocres, æqui, medii a lateralibus quam inter se vix remotiores et spatio oculo fere duplo latiore sejuncti. Oculi antici in lineam levissime procurvam. Area mediorum antice quam postice paulo angustior. Abdomen maximum, duriusculum, nitidissimum fere ut in *T. tricuspidata* Bl. aculeis tribus acutissimis et divaricatis instructum, sed aculeis majoribus et ad basin crassioribus, punctis impressis similibus et superficie, inter puncta, nitidissima haud punctata, supra fusco-olivaceum, interdum nigricans, ad marginem plus minus late et inordinate flavido-variatum et in medio maculis binis magnis ovatis, subgeminatis flavidis decoratum, aculeis obscure rufulis apice nigris, abdomen subtus fere omnino nigrum. Sternum obscure fulvo-rufescens, coriaceum. Pedes fulvo-ravidi, tarsis, præsertim anticis, infuscatis.

Brasilia : Caraça (prov. Minas) (E. Gounelle).

T. cribrata, n. sp. — Pl. 7, fig. 5. — ♀. Abd., long. 3,4 mill. lat. 4 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte thoracica utrinque nigricanti. Oculi postici magni et subæquales, medii a lateralibus quam inter se remotiores et spatio oculo paulo angustiore a sese distantes. Oculi antici in lineam levissime procurvam. Area mediorum subquadrata. Abdomen maximum, duriusculum et nitidissimum, triquetrum, ut in *T. tricuspidata* Bl. triaculeatum, sed aculeis anticis postico evidentius minoribus, punctis impressis similibus sed paulo majoribus et superficie dorsali omnino crebre et minute punctata, supra albido-lutescens, punctis impressis ordinariis nigris, punctis minoribus rufulis, aculeis nigris ad radicem rufulis, abdomen subtus albidum, in medio testaceum et parce nigro-variatum (in *T. tricuspidata* ad maximam partem nigrum). Sternum rufescens valde coriaceum. Pedes fulvo-rufescentes, tarsis anticis, femoribus patellisque posticis valde infuscatis.

Paraguay (Germain).

Paculla (1) **bicornis**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax brevis et altus, postice abrupte declivis, apice leviter prominulus, antice leviter declivis sed vix attenuatus, nigro-rufescens, lævis et nitidus, sed ad marginem granulatus et, supra, apice posteriore, linea granulosa semicirculari cinctus. Oculi inter se subæquales (medii reliquis vix minores), medii elongati recti et inter se contigui, a lateralibus anticis angustissime separati. Abdomen magnum, scutis ordinariis, nigro-rufulis, scuto dorsali convexo, nitidissimo, setis albidis consperso, scuto epigasteris nitido sed minute punctato. Sternum rufulum, grosse et regulariter impresso-punctatum. Pedes breves, fulvo-rufuli, patellis dilutioribus, tarsis quatuor anticis metatarsis æquilongis.

♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax paulo convexior. Clypeus sub oculis tuberibus parvis binis geminatis armatus. Pedes-maxillares fulvo-aurantiaci, femore infuscato; femore brevi; patella sat longa et arcuata; tibia patella multo breviore, et paulo angustiore; tarso semicirculari a bulbo fere coalito; bulbo magno et globoso, spina apicali parva.

Ins. Philippinæ : Manila !, Antipolo !.

A *P. acuminata* E. Sim. *(Polyaspis)* præsertim differt sterno grossius scrobiculato et scuto ventrali majore.

P. scrobiculata, n. sp. — ♀. Long. 3,5 mill. — A præcedenti, cui valde affinis est, et cephalothorace oculisque subsimilis, differt parte cephalica postice haud granulosa sed seriebus duabus punctorum impressorum supra notata, abdominis scuto dorsali lævi et nitidissimo, scuto epigasteris parce punctato, sterno grossius et densius impresso-punctato, pedibus fulvo-rufulis paulo longioribus, tarsis metatarsisque anticis circiter æquilongis.

Ceylon : Cottawa, prope Galle !.

Tecmesa quinquemucronata, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceus. Abdomen maximum, latius quam longius, utrinque truncatum et minute bimucronatum, postice ample rotundum et tuberculo medio majore et obtuso instructum, supra fere planum et tuberculo medio minutissimo munitum, subtus plicatum et postice, sub tuberculo magno, tuberculo multo minore notatum, duriusculum, crebre impresso-punctatum, nigrum, lurido-maculatum et

(1) J'ai proposé, en 1887 (Ann. Soc. ent. Fr., Bull.), le nom de *Paculla* pour remplacer celui de *Phaedima* Thorell, préoccupé; le genre *Polyaspis* E. Sim., 1888, est en synonymie.

variatum. Sternum nigro-rufescens, valde coriaceum. Pedes nigricantes, tibiis ad basin late rufescenti-annulatis, metatarsis tarsisque obscure fulvis, metatarsis ad apicem, tarsis anticis in medio nigricanti-annulatis. Pedes-maxillares nigricantes, tarso longo et compresso.

♂. Long. 1,6 mill. — Abdomen minus, fere æque latum ac longum, mucronibus minoribus et obtusissimis, supra nigrum, parce albido-pilosum, postice in declivitate transversim obscure luteo-maculatum. Pedes, præsertim antici, multo longiores. Pedes-maxillares breves et robusti, fusci, femore gracili, patella convexa nodosa, tibia patella vix breviore sed multo latiore, et multo latiore quam longiore, tarso magno, acuminato et paulum curvato, bulbo ovato, convexo sed simplici, apicem tarsum fere attingente.

Brasilia : Rio.

Familia **MIMETIDÆ.**

Gen. **Arocha**, nov. gen.

Ab *Eroni* differt cephalothorace longiore et humiliore, fronte angusta, oculis anticis inter se appropinquatis, mediis lateralibus multo majoribus et valde prominulis, tibiis metatarsisque anticis et intus et extus aculeis longissimis seriatis munitis.

A. erythrophthalma, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax luridus, lævis et glaber, processu oculorum nigricanti, oculis rufulis et coccineo-cinctis. Chelæ ad basin fulvæ ad apicem rufulæ. Abdomen (valde detritum) longius quam latius, apice ampliatum et tuberculatum, olivaceum, crebre flavo-punctatum et variatum. Sternum luridum, læve. Partes oris, margine excepto, infuscatæ. Pedes, præsertim antici, longissimi, luridi, coxis trochanteribusque cunctis, patellis et apice femorum quatuor anticorum fuscis, tibiis metatarsisque cunctis aculeis gracilibus longissimis, numerosis armatis. Vulvæ tuberculum nigro-rufulum, apice obtusum et linguiforme, supra ad basin minute biimpressum, apice minute bimucronatum.

Brasilia : Rio Tocantins ; Peruvia : Pebas.

Bertrana rufostriata, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax pallide luridus, lineis mediis exilibus rufo-lividis binis, oculos medios attingentibus, postice medium partis thoracicæ haud superantibus, ornatus, oculis nigro-limbatis. Area oculorum mediorum magna, paulo latior quam longior et antice quam postice multo latior. Ocul

medii antici posticis parum majores, postici spatio oculo paulo latiore inter se distantes. Clypeus oculis anticis latior. Abdomen magnum, globosum, supra albo-opacum, antice punctis inordinatis, postice lineolis, versus apicem curvatis et convergentibus, nigris rufisque decoratum, subtus in medio late olivaceum. Sternum fusco-violaceum. Chelæ luridæ, antice roseo-tinctæ. Pedes pallide flavi, subpellucentes, femoribus anticis subtus lineis exilibus nigricantibus binis, tibiis patellisque cunctis utrinque linea exili rufula ornatis, tarsis, præsertim anticis, infuscatis. Vulvæ uncus latus ovatus et verticalis sed postice leviter curvatus, testaceus, supra fusco-bilineatus. Pedes-maxillares pallide flavi, patella tibiaque supra rufo-unilineatis.

Peruvia orient. : Pebas (de Mathan).

B. flavosellata, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax luridus, interdum olivaceus, præsertim antice albido-setosus. Area oculorum mediorum evidenter latior quam longior et antice quam postice multo latior, oculi medii antici posticis paulo majores, postici spatio latitudinem oculi vix æquante inter se distantes. Clypeus oculis mediis anticis angustior. Abdomen magnum, altissimum, sed supra deplanatum, antice posticeque fere recte sectum, utrinque rotundum, supra fusco-testaceum vel nigrum, utrinque maculis maximis læte sulfureis ovatis, geminatis et antice paululum divaricatis, decoratum, subtus omnino pallide testaceum. Sternum, chelæ pedesque lurida, femoribus leviter olivaceis, tarsis anticis infuscatis. Vulvæ uncus verticalis, paulo longior quam latior, apice subacutus, rufulus et marginatus, subtus testaceus et fusco-marginatus.

Brasilia : prov. Para et Amazonas.

Gen. **Spintharidius**, nov. gen.

A *Bertrana* imprimis differt pedum anticorum tibiis metatarsisque inferne aculeis longis et gracillimis armatis, sterno postice breviter acuto et coxis posticis inter se subcontiguis, abdomine rhomboidali.

S. rhomboidalis, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax pallide luridus, parte cephalica antice leviter ferruginea et utrinque anguste cinereo-marginata, postice macula albido-opaca notata. Abdomen rhomboidale, longius quam latius, albido-cinereum, subtiliter fusco-reticulatum, antice in declivitate et postice supra mamillas, late albo-marginatum, subtus albo-testaceum. Sternum, chelæ, partes oris, pe-

desque pallide lurida, femoribus muticis, tibia 1[i] paris inferne aculeis setiformibus longissimis 3-3 et metatarso aculeis brevioribus 2-2 armatis, tibia 2[i] paris aculeis similibus 2-2 munita sed metatarso mutico. Vulvæ fovea ovato-transversa, scapum transversum, utrinque obtusum et marginatum includens, uncus albus, brevis et plicatus sat latus, sed apice acutus.

Paraguay (Germain).

S. cerinus, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax pallide luridus, parte cephalica postice macula albido-opaca notata. Abdomen rhomboidale, longius quam latius, fulvo-rufescens, subtiliter fusco-reticulatum, antice oblique flavo-marginatum, supra maculis latis transversis læte flavis et roseo-areolatis decoratum, subtus pallide flavum. Sternum, chelæ, partes oris pedesque pallide lurida, femoribus cunctis muticis, tibia 1[i] paris inferne aculeis setiformibus longis 3-3 et metatarso aculeis similibus sublasilaribus binis, armatis, tibia 2[i] paris aculeis 2-2 munita sed metatarso 2[i] paris mutico. Vulva fere præcedentis.

Brasilia : Matushinos (prov. Minas) (Gounelle).

Gen. **Arcidius**, nov. gen.

A *Gnolo* E. Sim. imprimis differt area oculorum mediorum latiore quam longiore et subparallela, clypeo area oculorum latiore vel saltem haud angustiore, pedibus brevibus, tibiis et sæpe metatarsis quatuor anticis aculeis inferioribus longis et divaricatis munitis sed serie interiore aculeorum minutorum carentibus, abdomine cordiformi, duriusculo, punctis ocelliformibus impresso.

A. unipunctatus, n. sp. — Pl. 7, fig. 6. — ♀. Long. 3,5—4 mill. — Cephalothorax pallide luridus, lævissimus, glaber, punctis parvis parcissime impressus. Area oculorum mediorum parva, medii antici posticis minores et spatio inter medios anticos et posticos angustissimo. Clypeus area oculorum plus duplo latior. Abdomen maximum, deplanatum, antice rotundum et partem thoracicam obtectum, postice sensim attenuatum et cordiforme, antice et in lateribus serie punctorum impressorum coronatum, in medio punctis impressis quatuor et prope apicem plicis transversis trinis notatum, læte flavum, pone medium puncto nigro ornatum. Sternum, partes oris pedesque albido-lurida, tibiis metatarsisque quatuor anticis aculeis inferioribus fuscis subpellu-

centibus 2-2 longissimis et divaricatis et tibiis utrinque aculeo laterali debiliore instructis. Area vulvæ simplex, transversim leviter striolata, fusco-marginata, longitudinalis, antice parallela, postice leviter ampliata.

Brasilia : Caraça (prov. Minas) (Gounelle).

A. lemniscatus, n. sp. — Pl. 7, fig. 7. — Long. 4 mill. — Cephalothorax præcedentis, pallide luridus. Area oculorum mediorum multo major et spatium inter anticos et posticos oculo vix angustius. Clypeus aream oculorum mediorum circiter æquans. Abdomen præcedentis sed latius, similiter impressum, supra rufo-cinnamomeum, antice vitta transversa marginali albido-opaca vittaque submarginali latiore valde dentata nigro-reticulata, postice, supra mamillas, macula subquadrata, dein lineis transversis parvis abbreviatis trinis nigro-reticulatis ornatum. Sternum, portes oris pedesque albido-lurida, femoribus, patellis tibiisque anticis, saltem ad apicem, postice nigricanti-lineatis, tibiis paris 1[i] inferne aculeis gracillimis parum longis et inæqualibus 8-10, parum regulariter uniseriatis, subtus instructis, reliquis articulis omnino muticis, setosis. Area vulvæ fovea sat magna latiore quam longiore, antice arcuata et marginata, impressa.

Brasilia : Caraça (prov. Minas) (Gounelle).

Gen. **Archemorus**, nov. gen.

Ab *Oarci* E. Sim. imprimis differt area oculorum mediorum plus duplo longiore quam latiore et prominula, tibiis metatarsisque anticis aculeis longis inferioribus tantum armatis.

A. Simsoni, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax antice rufo-brunneus, rugosus, crasse fulvo rufoque pubescens, postice testaceus et fere glaber. Abdomen longius quam latius, antice late rotundum, postice valde attenuatum et truncatum, ad marginem anticum tuberculis minutis binis, in medio tuberculo maximo obtuso et erecto, postice tuberculis septem, triseriatim ordinatis (1, 3, 3) supra notatum, fuscum, punctis impressis fulvis inordinate conspersum, tuberculis fulvis. Pedes breves et robusti, obscure luridi, apicem versus dilutiores, tibiis, metatarsis tarsisque anticis depressis, tibiis quatuor anticis in parte secunda aculeis divaricatis 3-5, metatarsis aculeis validissimis et longis 7-3, tarsis serie unica aculeorum minorum instructis.

Tasmania : Lanceston (Simson).

Familia **ARCHEIDÆ.**

Landana cygnea, n. sp. — ♂. Long. 3,5—4 mill. — Cephalothorax lævis, pallide luridus, antice utrinque linea obliqua abbreviata, in medio macula elongata, lanceolata, cinereis, parum expressis notatus, processu cephalico fere *Landanæ Petiti* E. Sim., sed paulo breviore et crassiore, cephalothorace haud longiore et antice oblique directo. Oculi quatuor postici in lineam subrectam, medii a lateralibus quam inter se remotiores et spatio oculo haud latiore a sese distantes, medii antici posticis majores et inter se remotiores. Clypeus oculis mediis anticis angustior. Abdomen parvum et altum, postice fere abrupte declive, lurido-testaceum, albo cinereoque variatum, tuberculis quatuor posticis anticis majoribus, quadratum designantibus, instructum. Chelæ cephalothorace longiores, luridæ, versus apicem leviter rufescenti-tinctæ, in parte basali gracillimæ teretes et læves, in parte apicali paulo crassiores, leviter depressæ, parellelæ et albido-crinitæ, et extus subtiliter granulatæ, apice subrecte sectæ, margine inferiore sulci dentibus fuscis binis acutis inter se carina geminatis, primo altero longiore, margine superiore processu obtuso dentibus uncatis trinis instructo, et prope unguem dente simili munito, ungue longo, subrecto et leviter sinuoso. Sternum ferrugineum. Pedes longi, luridi, femoribus tibiis metatarsisque anguste fusco vel olivaceo triannulatis, aculeis gracilibus paucis armati. Pedes-maxillares luridi, parvi; femore brevi, curvato, crasso sed ad basin attenuato; patella paulo longiore quam latiore, leviter ovata et convexa; tibia patella circiter æquilonga subparallela; tarso angusto, apice subacuto, sed intus ad basin apophysi magna subpellucenti, obtuse quadrata et leviter emarginata munito; bulbo ovato, apice attenuato.

♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax pallide luridus, fronte nigricanti, parte cephalica antice utrinque linea obliqua abbreviata lineaque media, pone oculos triangulariter ampliata et postice leviter dilatata, ornata, parte thoracica utrinque macula marginali abbreviata nigra notata. Frons leviter prominens, haud producta. Oculi medii antici posticis saltem duplo majores. Clypeus oculis mediis anticis haud latior. Abdomen altum, subglobosum, albo-opacum, atro-cinereo roseoque variegatum. Pedes luridi, annulis latis et valde sinuosis fusco-ferrugineis, sæpe nigricanti-marginatis, ornati. Sternum fuscum, antice macula media et utrinque maculis minoribus binis luridis ornatum. Chelæ sat breves et

crassæ, luridæ. Vulva simplex, tuberculo medio fulvo ovato-transverso notata.

Venezuela : San-Esteban !.

Dolichognatha tigrina, n. sp. — ♂. Long. 2,7 mill. — Cephalothorax sat longus, parte cephalica, superne visa, sat lata et parallela, luridus, area oculorum nigra, parte cephalica macula transversim triquetra postoculari, posticeque vitta transversa valde angulosa nigris, parte thoracica puncto medio parvo, notatis. Area oculorum mediorum minute bituberculata. Oculi quatuor antici inter se parum distantes, in lineam rectam, medii lateralibus fere duplo majores. Oculi postici parvi, in lineam leviter recurvam, medii inter se subcontigui sed a lateralibus late distantes. Abdomen breve et altum, albidum, crebre fusco-atomarium et linea media infuscata interrupta ornatum, tuberculis quatuor fulvis, in quadratum ordinatis, anticis posticis majoribus, instructum. Chelæ longæ, fuscæ, subtiliter coriaceæ. Sternum late cordiforme, leviter asperum, luridum, vitta media transversa latissima, in medio angustiore, maculaque apicali fulvo-ravidis, ornatum. Pedes longi (præsertim antici), luridi, valde fusco rufuloque annulati, femoribus anticis fere omnino infuscatis, tibiis cunctis metatarsisque posticis aculeis gracilibus albis fuscisque armatis. Pedes-maxillares minutissimi, luridi, tibia tarsoque ad basin nigro-notatis, tibia et patella longioribus quam latioribus et inter se subæquis, tarso parvo, teretiusculo, supra ad basin apophysi verticali pellucenti et apice uncata munito.

Venezuela : Caracas !.